

Botanisches Centralblatt.

REFERIRENDES ORGAN

für das Gesamtgebiet der Botanik des In- und Auslandes.

Herausgegeben

unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten

von

Dr. Oscar Uhlworm und Dr. F. G. Kohl

in Cassel.

in Marburg.

Zugleich Organ

des

Botanischen Vereins in München, der Botaniska Sällskapet i Stockholm, der Gesellschaft für Botanik zu Hamburg, der botanischen Section der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, der Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Upsala, der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, des Botanischen Vereins in Lund und der Societas pro Fauna et Flora Fennica in Helsingfors.

Nr. 17.

Abonnement für das halbe Jahr (2 Bände) mit 14 M.
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

1893.

Die Herren Mitarbeiter werden dringend ersucht, die Manuskripte immer nur auf einer Seite zu beschreiben und für jedes Referat neue Blätter benutzen zu wollen.

Die Redaction.

Wissenschaftliche Original-Mittheilungen.

Materialien zur Beschreibung der Hymenomyceten.

Von

M. Britzelmayr

in Augsburg.

(Schluss.)

Hygrophorus ligatus Fr; B. f. 1; h. f. 78 : Sp. 10 : 5; Herbst, Bergw., N.; — *hyacinthinus* Quel.; B. f. 51; Sp. 8, 10 : 4, 5; wohlriechend; Herbst, Wäld., A.; — *eburneolus* B. f. 6, 68; h. f. 79 : Sp. 10 : 6; Herbst, Wäld. A.; — *penarius* Fr; B. f. 2; h. B. f. 80; Sp. 6, 7 : 4; Herbst, Heiden, A.; — *erubescens* Fr.; B. f. 50, 54; — *discoideus* (Pers.) Fr.; B. f. 25, 45, 57; h. f. 81a: Sp. 8, 10 : 4, 6; schwacher Mehlgeruch; dann f. 81b mit grösseren Sp.; 10, 11 : 6; beide letzteren Formen im Herbste, Wäld. A.; — *aureus* Arrh.; B. f. 19; h. B. f. 82: Sp. 8 : 4; Herbst, Wäld., A.; — *olivaceo-albus* Fr. sensu Brig. t. 5 f. 1—3 u. zum Theil

sensu Schaeff. t. 312 : B. f. 83; Sp. 10:6; L. z. e., weiss; Somm., Wäld., A.; — *hypothejus* Fr.; B. f. 11; h. als Heideform: B. f. 99; Sp. 8, 10:4, 5; Herbst, N.: — *livido-albus* Fr.; B. f. 41; h. f. 84, 86: Sp. 10:6; dann forma *flavipes*, B. f. 85; beide Formen mit gleichen Sp.; nicht selten; Herbst, Wäld., A.; — *coibilis* B.; S. p. 400; B. f. 6; h. f. 100; Sp. 5, 6:3, 4; Herbst, Wäld., A.; — *pratensis* (Pers.) Fr.; B. f. 20, 22; forma *minor* f. 58; — *virgineus* (Wulf.) Fr. forma *ochroleuca* Price; B. f. 87; Sp. 10:5; Herbst, Wäld., A.; forma *fuscata*, B. f. 71; Sp. 10:6; B. H. Mitte braun; Herbst Lechauen, A.; dann forma *umbrinomarginata*, B. f. 70; Sp. 10, 12:6, oftmals fast dyblastisch; H. bräunlichweiss, Mitte braun, L. mit bräunlichem R.; Herbst, Wäld., O.; — *niveus* (Scop.) Fr.; forma *grisea*, B. f. 72 u. 73; Sp. 6, 9:3, 4; H. mit graulicher, braungraulicher Mitte; Herbst, Wäld., A.; — *cantharelliformis* B.; B. f. 89; Sp. 8:6; L. e. aderig-faltig, weiss; H. u. St. weisslich, ocker-gelblich, fleischfarben-gelblich; dem *H. micaceus* v.; Somm., Bergwäld., T.; — *ovinus* (Bull.) Fr.; sensu Bull. t. 580, non Cooke pl. 934 B.: B. f. 90; Sp. 10:8; ohne G., Herbst, Wies., N.; dem *H. Colemannianus*, Bres. t. 125 v., der aber gedrängte L. u. kleinere Sp. hat; — *sciophanes* Fr.; sensu Fr. t. 167 f. 1 und Cooke pl. 937 A, mit angehefteten L.; B. f. 92; Sp. 10:6; dann sensu Fr. Hym. eur. p. 417, mit herablaufenden L.: B. f. 93; Sp. 10:6, 8; Herbst, Wäld. A. — *laetus* (Pers.) Fr. sensu Cooke pl. 938; B. f. 94; Sp. 8, 10:3, 4; Herbst, Wäld. A. — *ceraceus* (Wulf.) Fr.; B. f. 37; h. f. 88 mit gelblichem u. f. 98 mit weisslichem St.; Sp. 6, 8:4, 5; Somm., Herbst; Waldwies., O.; — *miniatus* Fr.; B. f. 60a u. b; h. f. 95; Sp. 8, 10:6; Somm., Waldwies., N.; — *spectandus* B.; B. f. 91; Spst. weiss; Sp. 10, 11:5, 6; L. e., ausgerandet herablaufend, blass feuergelb; H. feuer-, ziegelroth, wenig faserig; ohne Geruch; Herbst, Wertachauen, A.; dem *H. speciosus* Peck v.; — *persistens* B., B. f. 64, 75, 76, 77; Sp. 10, 16:6, 10; L. weissgelblich, z. g., H. meist klebrig; H. u. St rotgelb bis blass-gelb, sich nicht schwärzend; Heiden, Waldwies., A., dann s. häufig um N.; dem *H. conicus* v.; — *chlorophanus* Fr. sensu Fr. t. 167 f. 3: B. f. 96; Sp. 8, 10:6; Herbst, Heiden, N.; — *chlorophanus* Fr. sensu Cooke pl. 909: B. f. 97; Sp. 8:4, 6; Somm. Herbst, Heiden, N.; — *chlorophanus* Fr. sensu Britz. f. 74; Sp. 8:4, 6; Herbst, Wies. u. Heiden, O.; —

Lactarius torninosus (Schaeff.) Fr.; „azonus et totus albo-tonentosus“ Sow. I. 103: B. f. 57; Sp. 8, 9:6; Herbst, H.; — *turpis* Fr.; B. f. 54; Sp. 6, 7:4, 5; Herbst, Wäld. A.; — *forma stipiti longo* B. f. 56; Sp. 8:6; Somm., Herbst, H.; — *acerrimus* B.; B. f. 55; Spst. gelblich; Sp. 12, 14:9, 10; alles blass rötllich gelb; L. herablaufend, g., wellig, auf den Seitenflächen fein geädert; St. seitlich; H. matt, undeutlich rotgelb gezont; Milch weiss, s. scharf; Fl. z. fest, sich nicht verfärbend; häufig im Som. unter Eschen, Eichen und Linden auf Wies., O., dem *L. insulsus* v.; — *zonarius* (Bull.) Fr.; B. f. 59; Spst. blass gelblich; Sp. 8:6; L. g., blass gelblich; Sommer in circa 1400 m. Höhe, T.;

— *utilis* (Weinm.) Fr.; B. f. 60 sed non sensu Cooke; Sp. 8 : 6; Herbst, H. — *hysginus* Fr.; B. f. 15, 30, 41; *chrysorrheus* Fr.; B. f. 58; Sp. 8 : 6; Milch weiss, dann gelb; Herbst, Wäld., A.; — *azonus* B.; B. f. 45, 61; Sp. 10, 11 : 8; L. z. g., blass gelblich-fleischfarben; H. u. St. grau oder bräunlich fleischfarben; H. ohne Zonen; Fl. und Milch weiss, weisslich, sich violett färbend; Geschmack z. widerlich; dem *L. violaceus* v.; Somm., Buchenwäld., T.; — *nominabilis* B.; B. f. 63; Sp. 10 : 6; alles semmel-fleischfarben; L. u. Fl. heller, weisslich-fleischfarben; L. abgerundet; Milch wässrig, weisslich, z. milde; Somm., Buchenwäld., T.; dem *L. pallidus* v.; — *platicus* B.; B. f. 44; Sp. 8 : 6; L. weiss, bei Verletzungen etwas bräunlich, abgerundet; St. weisslich; Fl. weiss; Milch weiss, scharf; Somm., Buchenwäld., T.; dem *G. pallidus* v.; — *vietus* Fr.; B. f. 21, 64; — *rubescens* Schrad.; B. f. 27, 43; — *proportionalis* B.; B. f. 62; Sp. 8 : 6; alles ochergelblich-weiss; L. s. g.; H. kaum faserig; Milch weiss, s. scharf; Fl. z. fest; dem *G. cyathula* v.; vielleicht weist die für diesen sich findende Bemerkung „exstat varietas pileo azono nec umbonato“ auf den *G. proportionalis* hin; Herbst, H.; — *mammosus* Fr.; B. f. 65; Sp. 8 : 5, 6; Somm. Wäld., T.; — *fuligineus* Fr.; B. f. 33a, 66; Sp. 10, 11 : 10; Somm., Herbst, H., O., T., A. —

Russula mustelina Fr.; B. f. 103; Sp. 8, 9 : 6; L. g., weiss, etwas gelblich; Fl. weiss, z. fest, kaum scharf; Herbst, Wäld., A.; — *furcata* (Pers.) Fr.; B. f. 4; h. f. 74 : Sp. 10 : 8, 9; Herbst, Wäld., O.; — *rosacea* Fr. *forma infundibuliformis* B.; B. f. 94; Sp. 10 : 8; L. z. e.; L. St. u. Fl. weiss; H. trichterförmig; Geschmack scharf; Sommer, Wäld. O.; — *rosacea* Fr. *forma alutaceo-maculata* B.; B. f. 76; Sp. 10 : 8; L. St. u. Fl. weiss, weisslich; St. mit gelbbräunlichen Anflügen; Geschmack scharf; Sommer, Wäld., O.; — *rosacea* Fr. *forma subcarnea* B.; B. f. 75; Sp. 8 : 6; L. z. g., weiss, verletzt sich bräunlich färbend; L. u. Fl. weiss; H. gelblich, gegen den R. fleischfarben; Fl. mit herbem Nachgeschmack; Sommer, Grünten in c. 1200 m. Höhe; — *incarnata* Quel.; B. f. 39; Geruch u. Geschmack milde; — *pulchralis* B.; S. V., p. 461; Cooke pl. 1095 A; B. f. 13, 73; Spst. gelblich; — *minutalis* B.; S. V., p. 461; B. f. 6; h. f. 77, 90 : Sp. 8, 10 : 6; Spst. gelblich; L. g.; Sommer, Wäld. T. — *leptida* Fr.; B. f. 11, 78; Sp. 8, 10 : 6, 8; L. weiss, g.; Fl. derb, ohne Geruch und Geschmack; Sommer, Herbst, Wäld. A.; — *leptida* Fr. *forma rubra* B.; B. f. 91; Geschmack mild; Sp. 10 : 8, 9; L. g. weisslich, kaum gelblich; H. roth; Fl. weiss, fest; Sommer, Buchenwäld., T.; — *rubra* Fr. sensu Vittad. t. 38 f. 2; B. f. 79, 80, Sp. 10 : 8, 10; L. z. g., weisslich, kaum gelbl.; Fl. z. fest; Geschmack scharf; Herbst, Wäld., A.; — *atropurpurea* Krombh.; Cooke pl. 1087; B. f. 87; Sp. 10 : 8, wenig rauh; L. wachsartig, z. e., weisslich; Geschmack z. mild; Sommer, Wäld. T.; — *atropurpurea* Krombh. *forma peracris* B.; B. f. 104; Sp. 8, 9 : 6, 7, wenig rauh; L. wachsartig, g., weisslich, blass gelblich; Geschmack s. scharf; Herbst, Wäld. A.; — *xerampelina* Fr.; B. f. 29, 42, 82; Sp. 10, 12 : 8, 10; Sommer, Herbst, Heiden, Wälder, A., N.,

O., T.; — *graveolens* Rom. in lit.; B. f. 85, Sp. 8:6; L. u. Fl. weisslich, blass gelblich; L. g. abgerundet; H. purpurroth, weinfarben, Fl. fest, von starkem Hummer- oder Häringslake-Geruch; Geschmack mild; Sommer, Wäld., O.; — *graveolens* Rom., forma *rubra* B.; B. f. 105; Sp. 12:8; L. weisslich, blass gelblich, bei Verwundungen sich schmutzig gelb-rötlich färbend; H. rot; Fl. weiss, z. fest; Geruch wie bei der Stammform; Geschmack mild; Herbst, Wäld., A.; — *grata* B.; B. f. 92; Spst. weiss; Sp. 12:10 oder 10 μ diam.; L. herablaufend, z. e., weisslich, nicht gegabelt, wachsartig, durchscheinend; H. u. Fl. blass semmelfarb., der St. unt. schmutzig gelbbraun; Hut-R. hökerig; Fl. nicht fest; Geschmack nicht scharf; Mandel-Geruch; Sommer, feuchte Bergschluchten, T.; — *farinipes* Rom. in lit.; B. f. 106; Sp. 8, 9:6, 7; L. g., weisslich, gelblich, bei Verletzungen sich bräunlich gelb färbend, schmal; Hut-R. kaum hökerig; H. glanzlos, gelblich; St. weiss, etwas mehlig; Fl. z. fest, weiss, weissl.; Geschmack scharf; Somm., Wäld., T.; — *paludosa* B. f. 33, 60, 96; mild; — *expallens* Gill.; B. f. 108, 112; Sp. 8, 10:8; L. weiss, weisslich, kaum gelblich; Fl. weiss, im St. schwammig; Geschmack bald weniger, bald mehr scharf; Sommer, Herbst, A., O., T.; — *emetica* Fr.; B. f. 107; Sp. 10:8, L. z. g., weiss; Somm., Herbst, Wäld., A. T.; — *fallax* Fr.; B. f. 24, 45, 68, 69; — *cavipes* B.; B. f. 98; Spst. weisslich, etwas gelblich; Sp. 10:6, 8; L. g., herablaufend, weiss; H. blass, schmutzig rötlich; St. weisslich, rötlich, innen glattröhrig; Geschmack s. scharf; Somm., Wäld., O.; der R. fallax v.; — *citrina* Gill.; B. f. 22, 102; Sp. 8, 10:8; — *citrina* Gill. forma *umbonata* B.; B. f. 100; Sp. 10:8; L. weiss, z. g.; Fl. z. fest; Geschmack milde; Herbst, Wäld., A.; *R. citrina* unterscheidet sich von der *R. constans* B. durch kleineren Wuchs, festeres Fleisch, durch herablaufende oder nahezu herablaufende L. etc.; auch findet sich die *R. constans* fast ausschliesslich nur in Mooren; — *aeruginea* Fr.; B. f. 111; Sp. 10:6, 8; L. z. e., weiss; Herbst, Wäld., A.; — *fragilis* (Pers.) Fr. forma *violacea* Quel.; B. f. 101; Sp. 8, 10:6, 8; Somm., H., A.; — *fragilis* (Pers.) Fr. var. *nivea* Pers.; B. f. 86, 88; Sp. 8, 10:6, 8; Somm. Buchenwäld., T.; *fragilis* (Pers.) Fr. var. *grisea* B.; f. 99; Sp. 10:8; Herbst, Wäld., O.; sämmtliche haben gedrängte weisse L. und einen s. scharfen Geschmack; — *truncigena* B.; B. f. 109; Spst. weiss; Sp. 8:6, s. rauh; L. u. St. weiss; L. angewachsen, g., nicht gegabelt, H. matt, glanzlos, gelblich, R. etwas gekerbt; Fl. weiss, von s. scharfem Geschm.; Somm., Buchenstümpfe, T.; der R. *fragilis* v. — *subcompacta* B.; B. f. 47, 71. — *veternosa* Fr.; B. f. 110; Sp. 10, 12:8, 10; L. weisslich, dann weisslich ocherfarben; Geschmack scharf; Herbst, Wäld., A.; — *nitida* (Pers.) Fr.; B. f. 28, 89; — *puellaris* Fr.; B. f. 48, 83; — *amoena* B.; Sacc. V, p. 479; B. f. 21, 84; — *nauseosa* (Pers.) var. *albida* B.; B. f. 93; Spst. u. L. ochergelb; Sp. 8, 10:7, 8; — *chamaeleontina* Fr.; B. f. 81, 95; Spst. u. L. gelb; Sp. 8, 10:6, 8; Geschmack mild; Somm., Herbst, O., T.; — *chamaeleontina* Fr., var. *latelamellata* B.; B. f. 97; Spst. u. L.

gelb; Sp. 10:8; L. s. g., s. breit; Geschmack mild; Somm., Buchenwäld., T. —

Marasmius rugulosus Schulz. et Bres.; B. f. 1, 20, 29, 37, 39; Sp. 9, 11:4, 5; Herbst, Waldrand, H.; — *porreus* Fr.; B. f. 33; Sp. 6:4; L. bräunlich weiss; Knoblauchgeruch; Somm., alte Baumstümpfe. O.; — *föniculaceus* Fr.; B. f. 41; Sp. 10, 12:4, 5; L. e., gelblich; mild; Herbst, H.; — *prasiosmus* Fr.; B. f. 35; Sp. 10, 12:4, 6; Knoblauchgeruch; Herbst, auf Eichenblättern, A.; — *globularis* Fr.; B. f. 21; h. f. 46; Sp. 7, 8:3, 4; Herbst, zwischen Buchenlaub, A.; im Habitus, namentlich durch den ob. erweiterten St., von Quelets Abbildung abweichend, im übrigen durchaus mit der betreffenden Diagnose übereinstimmend; — *fuscopurpureus* (Pers.) Fr.; B. f. 3, 36; Sp. stets 8, 10:4, 4½; Somm., Herbst, auf Buchenblättern, A. (Cooke's pl. 1121 b zeigt für M. fuscopurpureus eirunde Sporen, aber von einer Form, die für die Angabe 4:3 μ viel zu länglich ist); — *argyropus* (Pers.) Fr.; B. f. 7, 42; Sp. 8, 10:3, 4; Herbst, Wäld. A.; — *calopus* (Pers.) Fr.; lamellis decurr.: Bull. t. 550 f. 1, B. f. 26; lamellis emarginato-adnexis Cooke: pl. 1125 b; B. f. 43; letzterer Pilz: Sp. 8:4; Herbst, Wäld. A.; — *languidus* (Lasch) Fr.: B. f. 11; der Persoon'sche Name grossulus dürfte für diese Art vorzuziehen sein; — *amadelphus* (Bull.) Fr.; B. f. 27 mit Sporen, wie sie auch Bresadola für diese Art angibt; non Cooke t. 1127 A; — *ramealis* (Bull.) Fr.; B. f. 10, 31; Sp. 10:3, 4; dann sensu Cooke; B. t. 17, 44; Sp. 6, 8:3; Somm., Wälder, Fichtenrinden, A.; — *candidus* (Bolt.) Fr.; B. f. 9.; Sp. 10, 14:6, 8; — *molyoides* Fr.; B. f. 40; Sp. 10:7, 8; L. g. weisslich, Knoblauchgerueh; Somm., Buchenwäld. N.; — *splachnoides* Fr.; B. f. 34; Sp. 9:4; Herbst, Nadelwäld.; A.; — *saccharinus* (Batseh) Fr.; B. f. 45; Sp. 10:4; Herbst, Wäld., A. —

Lentinus lepideus Fr.; B. f. 1, 14, 15; Sp. 8, 12:4; — *cochleatus* Fr.; B. f. 5, 16; Sp. 5, 6:4, 5; Herbst, A., O., an Baumstümpfen: forma *occidentalis* Fr., nicht selten um A.; B. f. 18; Sp. 4—5 μ diam. — *omphalodes* Fr.; B. f. 17; Sp. 6:3, 4; Herbst, an faulenden Zweigen, H.; — *castoreus* Fr.; B. f. 6, 19; Sp. 4:3; — *undulatella* B.; B. (als *Troglia crispa* abgebildet), Sp. 6, 7:2; L. gelbbraun. meist mit weissem R., kraus, wellig; H. fleischfarben, graulich fleischfarben mit undeutlichen braunrothen Bändern, etwas wollig-filzig; Fl. weiss; Herbst, Winter, A., O. —

Panus conchatus Fr.; B. f. 12, dann Leuc. f. 381; Sp. 6, 8:2, 3; — *torulosus* Fr.; B. f. 16, 17; Sp. 6, 8:2, 3; Somm. Herbst, O., Eichenstümpfe. —

Troglia crispa (Pers.) Fr.; B. f. 20; Sp. 3, 4:¾, 1, gebogen; Somm., Herbst, an Buchenästen, O. (die Abbildung der Sporen auf Cooke's pl. 1114 A. passt nicht für *Troglia crispa*). —

Lenzites flaccida (Bull.) Fr.; B. f. 6; Sp. 7:5; Sommer, Buchenäste T. —

Polyporei.

Boletus flavus Wither.; B. f. 3, 57; Spst. bräunl.-gelb; Sp. 8, 10 : 2, 3; P. z. gross, rundlich-eckig; kommt in den verschiedensten Grössenverhältnissen vor; Somm., Herbst, A., T.; — *flavidus* Fr.; B. f. 62; Spst. röthlich-gelb; Sp. 8, 10 : 2, 3; P. gross; Herbst, Waldränder, A.; — *extractus* B.; B. f. 61, 70; Spst. grau-gelb; Sp. 9, 11 : 3, 3½; H. klebrig; H. u. St. gelbroth bis gelbbraun; Ring weisslich, häutig; St. über dem Ringe hellgelb; Pscht. weisslich bis röthlich gelb; P. klein, in einander gewunden; Fl. gelblich, gelb, unt. im St. röthlich oder bräunlichgelb, von mildem Geruch und Geschmack; Herbst, A., O.; dem *B. flavidus* v.; — *collinitus* Fr.; B. f. 63; Spst. rötlich braungelb; Sp. 8, 10 : 2, 4; P. verlängert, nicht zu zweien in einander; Herbst, Heiden, A.; — *bovinus* Linn.; B. f. 5, 36, 47, 48, 49, 50; — *mitis* Krombh.; B. f. 6, 37; Sp. 13, 14 : 4; — *guttatus* Pers.; B. f. 8, 59; Sp. 8, 10 : 3, 4; P. gross; Somm., Herbst, Wäld., A., T.; — *chrysenteron* (Fr.) sensu Bull. t. 490 f. 3 et Krombh. t. 76 f. 15—17; B. f. 64, 65; Sp. 14, 16 : 5, 6; Somm., Herbst, in Wäldern häufig; — *pascuus* Pers.; B. f. 10; Sp. 10, 12 : 5; Somm., Herbst, Allee-Rain, A.; — *pascuus* Corda apud Sturm t. 19 f. 1; B. f. 66; Spst. graugelb; Sp. 10, 13 : 4, 5; Herbst, lichte Wäld. A.; — *pachypus* Fr. sensu Lenz t. 60; B. f. 15; sensu Krombh. f. 67; Sp. 14 : 4, 5; Somm., Herbst, Wäld., A., T.; — *Lorinseri* Beck; S. VI, p. 25; B. f. 58; Spst. gelb; Sp. 10, 12 : 4; Somm., Bergweiden, N.; — *luridiformis* Rostk.; B. f. 20; hier wurde es übersehen, den obersten Teil des St. gelb zu malen; — *laricinus* Berk.; B. f. 56; Spst. braun; Sp. 10 : 4; Somm., Bergwäld. unter Lärchen, T.; — *larignus* B.; B. f. 22, 55; Spst. braun; Sp. 10, 13 : 4; Somm., Herbst, unter Lärchen, A., N.; — *indecisus* B.; B. f. 68; Spst. braun; Sp. 10, 12 : 4; alles grau bis isabellfarben braun; H. u. St. meist etwas fleckig; H. klebrig; St. beringt; P. z. gross, länglich rundlich bis rundlich eekig; Fl. weisslich, gelblich, grau, bräunlichgrau; Geschmack nicht angenehm; Herbst, A., H.; dem *B. fuligineus* v.; — *scaber* Fr. *forma holopoda* Rostk. t. 48; B. f. 69; Spst. bräunlich; Sp. 14, 16 : 6; Herbst, Moore, H., T.; — *lividus* Bull.; B. f. 45, 60; Sp. 6 : 4; Somm., Herbst, häufig in den Bergwäld. um T. —

Polyporus punctisporus B.; B. f. 140; Habitus des *P. flaves-*
cens Rostk. 27, 23; H. blossbraun, gelbbraun, Mitte dunkler, kaum
faserig, Pscht. ob. weiss, unt. blossbraun, s. dünn; P. s. klein,
punktiform; der ganze Pilz fleischig, von nicht unangenehmem
Geschmack; Sp. 4 μ diam; Herbst, auf Erde, Wäld., A.; dem
P. xoilopus Rostk. v.; — *brumalis* (Pers.) Fr.; B. f. 7, 12, 108;
h f. 142; P. z. gross, länglichrund; Sp. 8 : 2; an Erlenstümpfen,
Herbst, N.; — *tomentosus* Rostk.; B. f. 141; P. klein, länglich-
rund; Sp. 7, 8 : 2, 3; auf Buchenstümpfen, H., O.; — *arcularius*
(Batsch) Fr.; B. f. 143, 157; P. gross, eekig länglich rundlich;
Sp. 7, 8 : 2, 3; Herbst, Buchenstümpfe O.; — *fuseidulus* (Schrad.)
Fr.; B. f. 144; P. klein, länglich rundlich eekig; Sp. 6, 8 : 2, 2½;

Herbst, H.; — *calceolus* Bull.; B. f. 125; P. klein, rund; Sp. 10, 12 : 6, 7; Somm. T.; — *latisporus* B.; B. f. 124; H. gelblich, ocherfarben, mit dunkleren sich bald abnützenden Faserschuppen; St. ob. gelblich; nach unt. schwarz; Fl. weisslich; P. weiss, z. gross, länglich rund; ohne besonderen Geruch; Sp. 14 : 4; Somm., Buchenstümpfe, N.; — *nummularius* Fr., P. s. klein; Sp. 8, 10 : 3, 4; B. f. 132; Somm., Buchenäste N.; — *caesio-coloratus* B.; B. f. 145: H. am Grunde bräunlich, dann graubläulich mit weisslichem Rande: Pscht. weiss, bei Berührung stahlblau; P. s. klein, rund; Fl. weicher als Kork; Spst. weiss; Sp. gebogen, 5, 6 : $\frac{3}{4}$, 1; Herbst, Fichtenstümpfe, A.; dem P. *caesius* v.; — *chioneus* Fr.; B. f. 137; P. klein, rundlich; Sp. 3 : 1 $\frac{1}{2}$; Somm. Föhrenstümpfe, A.; — *fumosus* (Pers.) Fr.; B. f. 29, 34, 35; — *adustus* (Willd.) Fr.; B. f. 133; P. klein, kurz, rund, grau; Spst. weiss; Sp. 3, 5 : 2, 3; — *stillativus* B.; B. f. 124; H. filzig, am Grunde goldbraun-schwarz-filzig, gegen den R. heller, dieser goldbraun; Pscht. weisslich, braungelblich; P. kurz, klein, rund, thränend; Fl. bräunlich, undeutlich faserig, von etwas säuerlichem Geruche, nicht ganz korkhart, am Grunde härter; Spst. weiss; Sp. 10, 12 : 2, 3; Somm., alte Baumstümpfe, T. dem P. *Spongia* v.; — *helveolus* Rostk.; B. f. 127; P. klein, dickwandig; Somm., Buchenstümpfe, T.; — *pinicola* Fr.; B. f. 129; Spst. weiss; Sp. 10 : 4; Somm., Fichtenstümpfe, O., T.; — *semiovatus* Schaeff. hat kleinere, 4, 6 : 4 messende Sporen; — *marginatus* Fr.; B. f. 147; Somm., Fichtenstümpfe, T.; — *applanatus* (Pers.) Wallr.; B. f. 42; h. f. 128; P. s. klein, rund; Sp. braun, 8, 10 : 5, 6; Somm. Fichtenstümpfe, T.; — *nigricans* Fr.; B. f. 130; Somm., Birkenleichen, A., T.; — *igniarius* (L.) Fr.; B. f. 45; h. f. 148: P. s. klein, rundlich, dickwandig; Sp. 6, 8 : 4, 6; Sommer, Nussbäume A.; — P. *salicinus* (Pers.) Fr.; B. f. 49 a, 50; h. f. 131: P. klein rundlich, lilagrau; Sp. 4—6 μ diam.; Frühl., Weiden, A.; — *nodulosus* Fr.; B. f. 146; P. klein, zackig zerrissen, zimt- bis fleischfarben, stets weisslich, seidig schimmernd; Sp. 5, 6 : 3, 4; ausschliesslich an Buchen; Herbst, A.; der Name nodulosus ist nicht gut gewählt; denn der Pilz kommt nicht bloss in dieser Form, sondern eben so oft — je nach der Lage und Beschaffenheit des Substrates — in andern Formen vor, nämlich als *nodulosus* Fr. *forma lobata* B.; B. f. 55 und als *forma effusa* B.; B. f. 136; diese Form besteht fast nur aus Poren; die Sp. sind bei allen Formen gleich gestaltet und gleich gross und der weissliche seidige Schimmer der Poreschicht ist gleichfalls bei jeder Form vorhanden; — *hirsutus* Fr.; B. f. 150; P. klein, rundlich; Spst. sahnefarbig; Sp. 6, 8 : 2; Sommer, Birkenleichen, T.; — *velutinus* Fr.; B. f. 149; P. klein, rund, weiss, zuletzt bräunlich weiss, dünnwandig; Spst. weiss; Sp. 4 : 2; Herbst, Lindenstümpfe, A.; — *zonatus* Fr.; B. f. 151; P. klein, rundlich, dickwandig; Sp. 7, 8 : 2 $\frac{1}{2}$, 3; Herbst, Birken, H.; — *Medulla panis* (Pers.) Fr.; B. f. 65; Sp. 4, 6 : 2, 3, wasserhell, nicht mit einem Kerne; — *sanguinolentus* A. et Schw.; B. f. 152; weiss, bei Berührung blutfarben, dann bräunlichroth; Spst. weiss; Sp. 4—5 μ diam. —

Trametes suberosa Quel.; B. f. 78, 135; P. klein, rund, dickwandig; Herbst, Pappelstümpfe, A.; *suaveolens* (L.) Fr.; B. f. 80, 138; Anisgeruch; P. rund, ziemlich gross, dickwandig; Spst. weiss; Sp. 10, 12 : 4; Herbst, Weiden, A.; — *cinnabarina* (Jacqu.) Fr.; Spst. weiss; Sp. 4, 6 : 2, 3; dieser Pilz hat oft einen ziemlich starken, angenehmen, obstartigen Geruch; B. f. 134. —

Dädalea quercina (L.) Pers.; B. f. 83, 153; Spst. weiss; Sp. 7, 8 : 3; Herbst, Eichen, überall häufig. —

Merulius tremellosus Schrad.; B. f. 86, 155; Spst. weiss; Sp. 4 : 1, 1½ oft gebogen; — *Corium* Fr., sensu Fuckel, non Spegazzini; Sp. 6, 7 : 3, farblos. Herbst, Baumstümpfe, A.; — *metropolitanus* Fr.; B. f. 139; Pseht. gewunden fältig, graurot, dann gelblich; Sp. 6, 8 : 2, 3; Herbst, Baumstümpfe, A.; — *lacrymans* Jacqu.) Fr.; B. f. 85; Spst. gelbbraun, isabellfarben rötlich; Sp. gelb, goldgelb, 10. 11 : 6; Herbst, faulende Balken, H. —

Thelephorei.

Thelephora terrestris Ehrh. pileo laciniato; B. f. 30; Spst. rotbraun-violett; B. f. 30; Spst. rothbraun-violett; Sp. 10 : 8; Herbst, H., Erde und Stümpfe überziehend; — *laciniata* Pers.; B. f. 10, 29; Sp. 10 : 6, 8; Wälder, Moore, A., H., N.; — *sebacea* Pers.; B. f. 12, 33; Sp. 10, 16 : 6, 8; Herbst, feuchte Waldplätze, A., O., T. —

Stereum purpureum Pers.; B. f. 34; Spst. weiss; Sp. 6 : 2½, 3; Herbst, Pappelstümpfe, A.; — *spadiceum* Fr.; B. f. 31 u. 32; Spst. weiss; Sp. 10, 11 : 4; Herbst, Baumstümpfe, A., H. —

Corticium incarnatum Pers.: B. f. 19; Sp. gebogen 12 : 4; Frühl. bis Herbst; an feuchten halbschattigen Stellen an Holz und Rinden häufig. —

Clavarici.

Clavaria subfastigiata B.; B. f. 43, 64, 78; Sp. 10 : 8; Sonn., Herbst, Heiden, A., O., N.; — *extans* B.; B. f. 79 = Cl. Kunzei sensu Quel. II. 11, Aeste lang, dünn, rundlich, oft keulenförmig, weiss, gelblich; Spst. weiss; Sp. 6 : 3, 4; Herbst, Wäld., A.; — *corrugata* Karst.; B. f. 17, 80, 81; eine s. veränderliche Art; Spst. gelb, ochergelblich; Sp. 6, 8 : 3, 4; — *flaccida* Fr.; B. f. 21, 82; Spst. gelb, dottergelb; Sp. 4. 5 : 2, 3; Herbst, Fichtenwälder, A., O.; — *stricta* Pers.; B. f. 25, 83; Spst. gelb, hellgelb; Sp. 6 : 3; — *gracilior* B.; B. f. 74, 84; Spst. weiss; Sp. 6, 8 : 3, 4; Herbst, Heiden, A., N., O. —

Pterula multifida Fr.; B. f. 85; Spst. weiss; Sp. 6, 8 : 2, 3; verworren durcheinander wachsend; etwas Fleckseifen-Geruch, Sonn., Herbst, auf faulendem Tannenreisig, T. —

Tremellinei.

Tremella mesenterica Retz.; B. f. 17; Sp. 11, 15 : 9, 10; Herbst, faulende Laubholzstümpfe, A.; — *pinicola* B.; B. f. 19; gallertartig, aussen pommeranzenfarbig, innen heller; ohne St.

oder kurz gestielt; aus der Rinde von Fichten, Föhren oder Latschen hervorbrechend; Oberfläche kleinwellig und kleingrubig; im Uebrigen auch bezüglich der Sporen wie *T. mesenterica*; während des ganzen Jahres, N. H.; — *conglobata* B.; B. f. 15; zusammengeballte Kugeln bildend, gallertartig, weisslich, schmutzigweisslich; Sp.: $7\frac{1}{2}$, 8 : $3\frac{1}{2}$, 4; der *T. viscosa* v.; Herbst, Erlenstümpe, A.; — *rubro-violacea* B.; B. f. 20; Sp. 6, 7 : 2; knollig wulstig aus der Rinde von Föhren hervorbrechend, gallertartig, blutroth, rosenroth, dann violett, endlich grau und weisslich; R. sich aufstülpnd; Herbst, Föhren, O.; der *T. violacea* v. —

Dacrymyces fragiformis (Pers.) Nees.; Sp. 5, 6 : $1\frac{1}{2}$, 2; Herbst, Baumstümpe, auch auf Moose übergehend; — *deliquescent* (Bull.) Dub.; Sp. 14 : 6, 8, 1—4 blastisch; Herbst, Tannenholz, O.; — *multiseptatus* Beck; B. f. 16; Sp. 20 : 6, 3—9 blastisch; Sonum., an Fichten, Bergwälder, T. —

Instrumente, Präparations- und Conservations-Methoden etc.

Bielajew, W., Ueber die Herstellung pflanzlicher Präparate mit Hilfe des Mikrotoms. (Separat-Abdruck aus Scripta botanica. 1892.) 8°. 8 pp. St. Petersburg 1892. [Russisch mit deutschem Résumé.]

Verf. beschreibt das von ihm mit Erfolg benutzte Verfahren, welches sich vor den bisher empfohlenen durch grössere Einfachheit auszeichnet. Zum Fixiren wird namentlich Perennyi'sche Flüssigkeit (3 Theile 0.5% CrOs, 4 Theile 10% HNO₃, 3 Theile Alkohol) empfohlen, welche den Objecten ungefähr die Consistenz des Einbettungsmittels ertheilt. Nach Fixirung und eventuell Färbung wird das Object allmählich in absoluten Alkohol und in reines Xylol übertragen, dann in eine gesättigte Lösung von Paraffin in Xylol, in der es einen Tag bei 35° bleibt. Zuletzt wird es auf 47° erwärmt und dann in bei 45° schmelzendes Paraffin übertragen.

Weiter verdient hervorgehoben zu werden das Verfahren, die Serienschnitte auf dem Objectträger zu befestigen. Es geschieht dies einfach durch Auflegen auf den mit destillirtem Wasser benetzten Objectträger; nach einigen Stunden sind die Schnitte angetrocknet und werden nunmehr weder durch Xylol, noch durch Alkohol weggewaschen. Sollen die Schnitte auf dem Objectträger gefärbt werden, so empfiehlt es sich, behufs sicherer Haftens, den Objectträger vorher auf das Sorgfältigste zu reinigen; dies geschieht durch Abwaschen mit KOH und destillirtem Wasser; nach dem Verdunsten des letzteren wird der Objectträger mit 40% Alkohol benetzt. — Das Uebrige ist bekannt.

Rothert (Kazan).